

1. Укажите генотип организма, образующего один тип гамет — Ab:

1) $\frac{A}{a} \frac{B}{b};$

2) $\frac{A}{A} \frac{b}{b};$

3) $\frac{A}{a} \frac{b}{b};$

4) $\frac{A}{A} \frac{B}{b};$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

2. Доминантная гомозигота по аллелям первого гена и гетерозигота по аллелям второго гена может иметь буквенное обозначение генотипа:

1) aaBb 2) Aabb 3) AABb 4) AABB

3. Укажите генотип организма, сформировавшего четыре типа гамет в следующем процентном соотношении — 45% $\underline{Cd}$; 45% $\underline{cD}$; 5% $\underline{CD}$; 5% $\underline{cd}$:

1) $\frac{Cd}{cD};$

2) $\frac{Cd}{cd};$

3) $\frac{CD}{cd};$

4) $\frac{CD}{Cd};$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

4. Укажите генотип организма, сформировавшего четыре типа гамет в следующем процентном соотношении — 46% $\underline{St}$; 46% $\underline{sT}$; 4% $\underline{ST}$; 4% $\underline{st}$:

1) $\frac{St}{st};$

2) $\frac{St}{sT};$

3) $\frac{ST}{st};$

4) $\frac{ST}{sT};$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

5. Укажите генотип организма, сформировавшего четыре типа гамет в следующем процентном соотношении — 42% $\underline{Np}$; 42% $\underline{nP}$; 8% $\underline{NP}$; 8% $\underline{np}$:

1) $\frac{Np}{np};$

2) $\frac{Np}{nP};$

3) $\frac{NP}{np};$

4) $\frac{NP}{nP};$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

6. Укажите генотип организма, сформировавшего четыре типа гамет в следующем процентном соотношении — 43% $\underline{Lm}$; 43% $\underline{lM}$; 7% $\underline{LM}$; 7% $\underline{lm}$:

1) $\frac{LM}{lm};$

2) $\frac{LM}{lM};$

3) $\frac{Lm}{Lm};$

4) $\frac{Lm}{lM};$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

7. Расщепление по фенотипу в F_1 составит 1 : 1 при скрещивании организмов с генотипами:

1) Pp и pp 2) Pp и Pp 3) PP и pp 4) $PPRR$ и $pprr$


8. Потомство F_1 будет единообразным по фенотипу при скрещивании организмов с генотипами:

1) Rr и rr 2) Rr и Rr 3) RR и rr 4) $RrSs$ и $rrss$

9. Потомство F_1 будет единообразным по фенотипу при скрещивании организмов с генотипами:


1) Mm и mm 2) Mm и Mm 3) MM и mm 4) $MmNn$ и $mmnn$

10. Какая стадия эмбрионального развития ланцетника изображена на рисунке?



1) морула; 2) гаструла; 3) нейрула; 4) бластула.

11. На схеме развития мужских половых клеток млекопитающих сперматиды обозначены цифрой:



- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

12. Согласно эволюционной теории Ч. Дарвина движущими силами эволюции являются:

- 1) меняющиеся условия окружающей среды; 2) борьба за существование и естественный отбор;
3) наследственность и изменчивость живых организмов;
4) приспособленность организмов к среде обитания и многообразие видов.

13. Размножение при помощи листовых черенков — это способ:

- 1) фрагментации; 2) полового размножения; 3) диплоидного партеногенеза; 4) вегетативного размножения.

14. Размножение при помощи видоизмененных побегов — это способ:

- 1) фрагментации; 2) полового размножения; 3) вегетативного размножения; 4) диплоидного партеногенеза.


15. Укажите природный комплекс, имеющий в Беларуси статус национального парка:

- 1) Нарочанский; 2) Свитязянский; 3) Березинский биосферный; 4) Полесский радиационно-экологический;
5) Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси.

16. Березинский биосферный — это природный комплекс, имеющий в Беларуси статус:

- 1) заказника; 2) ноосферы; 3) заповедника; 4) памятника природы; 5) национального парка.

17. Клетка, обозначенная на схеме оогенеза цифрой 3:




- 1) созревает в яичнике 2) является диплоидной 3) называется полярное тельце
4) формируется в период эмбрионального развития женской особи

18. В процессе сперматогенеза у млекопитающих различают четыре периода. В период созревания:


- 1) делятся первичные полярные тельца 2) сперматиды преобразуются в сперматогонии
3) сперматциты первого порядка делятся мейозом 4) образуются жгутик и акросома, меняется форма клетки

19. Клетка, обозначенная на схеме оогенеза цифрой 4:




- 1) созревает в яичнике 2) является гаплоидной 3) называется ооцит второго порядка
4) формируется в период эмбрионального развития женской особи

20. Клетка, обозначенная на схеме сперматогенеза цифрой 5:




- 1) созревает в яичнике 2) называется сперматоцит первого порядка
3) образуется в результате первого мейотического деления
4) формируется в период эмбрионального развития мужской особи

21. Клетка, обозначенная на схеме оогенеза цифрой 1:




- 1) является гаплоидной 2) созревает в маточной трубе 3) интенсивно делится путем митоза
4) называется ооцит второго порядка

22. Клетка, обозначенная на схеме оогенеза цифрой 5:




- 1) созревает в яичнике; 2) интенсивно делится путем митоза; 3) содержит запас питательных веществ;
4) образуется в результате первого мейотического деления.

23. Клетка, обозначенная на схеме сперматогенеза цифрой 1:




- 1) имеет акросому 2) называется сперматидой 3) формируется в предстательной железе
4) образуется в результате первого мейотического деления

24. Клетка, обозначенная на схеме оогенеза цифрой 4:




- 1) созревает в яичнике 2) является гаплоидной 3) называется ооцитом второго порядка
4) формируется в период эмбрионального развития женской особи

25. Клетка, обозначенная на схеме сперматогенеза цифрой 3:



- 1) созревает в яичнике
- 2) называется сперматоцит первого порядка
- 3) образуется в результате первого мейотического деления
- 4) формируется в период эмбрионального развития мужской особи

26. Клетка, обозначенная на схеме оогенеза цифрой 1:



- 1) созревает в маточной трубе
- 2) является гаплоидной
- 3) интенсивно делится путем митоза
- 4) называется ооцит второго порядка

27. В процессе сперматогенеза у млекопитающих различают четыре периода. В период размножения:

- 1) образуются первичные полярные тельца
- 2) сперматиды преобразуются в сперматозоиды
- 3) сперматогонии интенсивно делятся путем митоза
- 4) в результате первого деления мейоза образуются сперматоциты второго порядка

28. В процессе сперматогенеза у млекопитающих различают четыре периода. В период роста:

- 1) образуются сперматоциты первого порядка
- 2) сперматиды преобразуются в сперматозоиды
- 3) сперматогонии интенсивно делятся путем митоза
- 4) в результате первого деления мейоза образуются первичные полярные тельца

29. В процессе оогенеза у млекопитающих различают три периода. В период роста:

- 1) образуются ооциты первого порядка
- 2) первичные полярные тельца делятся митозом
- 3) в результате первого деления мейоза образуются ооциты второго порядка
- 4) диплоидные предшественники половых клеток преобразуются в сперматиды

30. В процессе оогенеза у млекопитающих различают три периода. В период созревания:

- 1) ооциты первого порядка делятся мейозом
- 2) деление оогониев прекращается, они начинают расти
- 3) образуются жгутик и акросома, меняется форма клетки
- 4) диплоидные предшественники половых клеток преобразуются в оогонии.

31. Угроза обморожения выше при морозной погоде с сильным ветром, чем в безветренную погоду. Это пример:

- 1) действия лимитирующего фактора
- 2) незаменимости экологического фактора
- 3) взаимодействия экологических факторов
- 4) действия биотических экологических факторов

32. Для предотвращения увядания злаков при низком содержании доступного азота требуется больше воды, чем при высоком его содержании. Это пример:

- 1) действия лимитирующего фактора 2) незаменимости экологического фактора
3) взаимодействия экологических факторов 4) действия биотических экологических факторов

33. Отсутствие воды делает жизнь растений невозможной даже при условии благоприятного сочетания других факторов. В данном случае влажность — это:

- 1) лимитирующий фактор 2) экологический максимум 3) главный биотический фактор
4) верхний предел выносливости

34. У голубя 40 групп сцепления. Сколько хроматид содержится в клетке голубя в конце анафазы мейоза I?

- 1) 20; 2) 40; 3) 80; 4) 160.

35. Какой путь достижения биологического прогресса привел к появлению различных органов прикрепления (крючьев, присосок, присасывательных щелей) у ленточных червей?

- 1) катагенез; 2) аллогенез; 3) дивергенция; 4) конвергенция.

36. В транскрибируемой цепи ДНК триплет ТАЦ кодирует аминокислоту метионин. Определите антикодон метиониновой тРНК:

- 1) АТГ; 2) АУГ; 3) ТАЦ; 4) УАЦ.

37. Выберите признаки, указывающие на принадлежность человека к типу Хордовые:

а) наличие у эмбриона нервной трубки; б) дифференциация зубов на резцы, клыки и коренные; в) наличие внутреннего осевого скелета; г) три слуховые косточки в среднем ухе; д) внутриутробное развитие и вскармливание потомства молоком.

- 1) а, б, д; 2) а, в; 3) б, г, д; 4) в, г

38. Выберите признаки, указывающие на принадлежность человека к отряду Приматы:

а) противопоставление большого пальца руки остальным; б) три слуховые косточки в среднем ухе; в) наличие молочных, сальных и потовых желез; г) наличие у эмбриона осевого скелета, представленного хордой; д) дифференциация зубов на резцы, клыки и коренные.

- 1) а, б, в; 2) а, в, д; 3) б, г, д; 4) только а.


39. В кариотипе диплоидного вида крыжовника 16 хромосом. Сколько хромосом и хроматид будет в соматической клетке во время метафазы митоза?

- 1) 8 хромосом и 8 хроматид; 2) 8 хромосом и 16 хроматид; 3) 16 хромосом и 16 хроматид;
4) 16 хромосом и 32 хроматиды; 5) 2 хромосомы и 16 хроматид.

40. В кариотипе диплоидного вида томата 24 хромосомы. Сколько хромосом и хроматид будет в соматической клетке во время метафазы митоза?


- 1) 12 хромосом и 12 хроматид; 2) 12 хромосом и 24 хроматид; 3) 24 хромосом и 24 хроматид;
4) 24 хромосом и 48 хроматиды; 5) 48 хромосомы и 24 хроматид.

41. Укажите набор хромосом (n) и количество хроматид (c) в клетке, обозначенной на схеме сперматогенеза цифрой 4:



- 1) $1n1c$ 2) $1n2c$ 3) $1n4c$ 4) $2n1c$ 5) $2n4c$


42. Укажите набор хромосом (n) и количество хроматид (c) в клетке, обозначенной на схеме оогенеза цифрой 1:



- 1) $1n1c$ 2) $2n4c$ 3) $1n4c$ 4) $1n2c$ 5) $2n1c$


43. На рисунке изображена схема жизненного цикла зеленой водоросли.

Знаком «?» обозначено:



- 1) оплодотворение 2) образование пыльцы 3) развитие спорангиев 4) формирование плода

44. Укажите стадию жизненного цикла кукушкина льна, обозначенную на схеме цифрой 4:



- 1) архегоний 2) протонема 3) яйцеклетка 4) сперматозоид